



# Kontraindikace

## Zákrok nelze provést při:

- těhotenství
- kojení (po ukončení kojení počkat alespoň 2 měsíce, dokud se neustálí hladina hormonů)
- keloidní jizvy
- epilepsie
- imunodeficiencie a onkologičtí pacienti v léčbě (aplikace je možná nejdříve 6 měsíců po léčbě)
- jakékoliv infekční onemocnění
- virová hepatitida, AIDS, zánět spojivek, onemocněním dýchacího traktu, různými virózy, ale i například rýmou (aplikace je možná po 10 dnech dobrání antibiotik)
- nemoci krve
- klienti s poruchami srážlivosti krve, či jinými nemocemi krve nemohou PMU podstoupit
- užívání antibiotik
- lymfedém

## Po konzultaci s lékařem:

- alergie, diabetes, velmi vysoký krevní tlak, atopický ekzém, kožní onemocnění, léky proti depresím apod.
- srdečně cévní problémy (pouze s potvrzením od lékaře)

## Upozornění

- 24 hodin před zákrokem prosím nekonzumujte žádný alkohol, kávu nebo energetické nápoje.
- 10 dní před zákrokem nenavštěvujte solárium a nebarvěte si obočí.
- 4 týdny před zákrokem nepodstupujte chemický peeling, laserové ošetření, aplikaci botoxu a výplní čela a vystavení silnému slunečnímu světlu. Kůže nesmí být v zánětlivém procesu.